

Symptômes pour lesquels l'élève doit demeurer à la maison pour une période de 24 h

Si votre enfant présente des symptômes parmi ceux indiqués dans la liste ci-dessous, il est recommandé de le garder à la maison et qu'il évite les contacts avec les autres personnes.

Attendez 24 h et réévaluez l'évolution des symptômes.



Fièvre

Enfant de **0-5 ans** :

- température **rectale** de 38,5 °C (101,3 °F) et plus

Enfant de **6 ans et plus** :

- température **buccale** de 38,1 °C (100,6 °F) et plus



Symptômes généraux

- Perte soudaine d'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût
- Grande fatigue
- Perte d'appétit importante
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)



Symptômes respiratoires

- Toux (nouvelle ou aggravée)
- Essoufflement, difficulté à respirer
- Mal de gorge
- Nez qui coule ou nez bouché



Symptômes gastro-intestinaux

- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée
- Maux de ventre

Après 24 h d'observation

- En présence de symptômes décrits dans les encadrés qui suivent, l'élève doit être retiré du milieu scolaire et devrait être dépisté pour la COVID-19.
- Si le dépistage est refusé par le parent, l'élève devra demeurer au moins **10 jours** à la maison.
- Si le dépistage est effectué, le parent devra suivre les consignes de la santé publique qui lui sont données au moment de la réception du résultat du test et il devra communiquer les informations à l'école.

Groupe A

UN des symptômes du **groupe A** et qui persiste pendant 24 h ou plus après son apparition :

- fièvre : température buccale 38,1°C;
- perte du goût ou de l'odorat;
- symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficultés à respirer.

OU

Groupe B

Au moins DEUX symptômes du **groupe B** et qui persistent pendant 24 h ou plus après leur apparition :

- maux de ventre;
- vomissements;
- diarrhée;
- mal de gorge;
- rhinorrhée (nez qui coule) ou congestion nasale;
- grande fatigue;
- perte d'appétit importante;
- douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique).

Si, après 24 h, l'élève présente un seul symptôme du groupe B : il peut retourner à l'école s'il ne fait pas de fièvre sans prendre d'antipyrétique (ibuprofène, ex. Advil, Motrin, etc.) S'il n'a pas vomi depuis 24 h et qu'il est assez en forme pour suivre les activités.